

## De behandeling

Voordat de behandeling start zal de cliënt moeten zorgen voor een allergietest. Dit om een bijengif allergie uit te sluiten. Het is verstandig om uw arts op de hoogte te stellen van de behandeling die u gaat volgen. Indien mogelijk zou u tijdens de behandeling geen medicatie kunnen gebruiken, vandaar het overleg met uw arts. Zo kun je meten of de behandeling ook daadwerkelijk helpt. Er zal ook gekeken worden wat bv de bloedwaarden zijn (ingeval van reuma) om deze tijdens de behandeling te kunnen vergelijken. Er wordt tevens door de cliënt voor aanvang van de behandeling een aansprakelijkheid-verklaring getekend.

Dan kan er gestart worden, eerste dag met één steek, vaak op de onderarm. En zo om de dag verder en dan langzaam opbouwen en ondertussen kijken wat de reactie is. Een normale te verwachten reactie van het lichaam op het gif zal zwelling, roodheid en jeuk zijn. Dit zal gedurende de gehele behandeling in meer of mindere mate voorkomen. Tijdens de therapie is er altijd een verpleegkundige aanwezig die indien nodig de epipen kan gebruiken. De epipen is een auto-injector waaruit 0,3 mg adrenaline vrijkomt en is er om de anafylactische shock tegen te gaan zodat er altijd tijd is om medische hulp in te schakelen.